




Ökosystem Waldgarten:
Möglichkeiten von Zweitkulturen in
Trüffelanlagen

-
- Ehemals Dozent an der BFH-HAFL, heute selbständig: Food Forests und Permakultur: Beratung, Führungen Kurse, Planung, Realisierung, Unterhalt
 - Stadtwirt, Bern
 - Projektleiter “Selva-Foresta Commestibile, Tecetto”, Gerra (Gambarogno, TI)
 - Netzwerk EssWaldLand.ch
-



- Waldgärten als antropogene Landschaft



The Ts'imsyen forest garden in northwestern B.C. is part of a groundbreaking new study by Simon Fraser University. PHOTO BY STORM CARROLL


Klassische Kastanienselve von Arosio

Foto: Giorgio Moretti




Homegarden in Sri Lanka






Schichten eines Waldgartens

La succession végétale, ou l'épopée de la terre nue à la forêt



Prairie pâturée Arrivée des pionnières Fermeture du tapis
herbacé – Conquête
par les ronces Émergence de petits
arbres ligneux



..... Lande arbustive
– Les ronces disparaissent Stade forestier
Stade forestier mature

Sukzessionsstadien eines Waldes



**Universität
Zürich** ^{UZH}

Universität Zürich

Institute of Systematic and Evolutionary Botany


Waldgärten in der Schweiz

Eine Übersichtsanalyse

Masterarbeit von:

Paul Wieduwilt

https://www.waldgarten.ch/Masterarbeit_Paul_Wieduwilt.pdf



EssWaldLand

Die Waldgärtner - Les Sylvaniers - The Food Foresters

Wir bepflanzen die Schweiz mit Esswäldern in der Landwirtschaft, in Städten und Gemeinden.

Für mehr regionale Lebensmittel, mehr Biodiversität, mehr Wohlbefinden und für Resilienz gegenüber einem sich verändernden Klima.

Creating Networks





Zusammenarbeit mit der Hochschulmensa







Tiny Urban Food Forest, Bern











An aerial photograph of a coastal town, likely in Italy, showing a mix of residential buildings and a large forested area. A red line outlines a specific section of the forest on a hillside. The town is situated along a body of water, with a road and railway line running parallel to the coast. The background features steep, forested mountains.

Selva-Foresta
Commestibile
Tecetto








Nach Ulrich (1981) können folgende Pufferbereiche unterschieden werden:

Calciumcarbonat-Pufferbereich	pH 6,21 - 8,00	□
Silikat-Pufferbereich	pH 5,01 - 6,20	■
Austauscher-Pufferbereich	pH 4,21 - 5,00	■
Aluminium-Pufferbereich	pH 3,81 - 4,20	■
Aluminium/Eisen-Pufferbereich	pH 3,21 - 3,80	■
Eisen-Pufferbereich	pH 2,41 - 3,20	■



1:800 000



Landesforstinventar LFI
Inventaire forestier national IFN
Inventario forestale nazionale IFN
Inventari forestal nazionali IFN

Basiskarte: © 1988, Bundesamt für Landestopographie, Wabern

