



Trüffel-Käfer-Fallen



TROUGH: Large-diameter PVC
Pipe with end caps glued on;
Saw in half lengthwise.

Fill with 100% Ethylene glycol (antifreeze)
or propylene glycol (Less toxic to dogs!)
to preserve DNA. If you don't need
to preserve DNA, use 50% H_2O , 50% glycol.

Schädlingsbekämpfung in Trüffelplantagen: Leiodes (Schwammkugelkäfer)



Es gibt bisher wenig Hinweise auf eine natürliche Bekämpfung der Schwammkugelkäfer. Die vorliegende Methode benutzt Gift.

An die Bäume wird ein Netz gebunden, das mindestens einen Meter hoch sein sollte; die Breite spielt keine Rolle, jedoch sind mehr als 2-3 Meter schwierig zu handhaben. Wir können Fliegengitter aus dem Baumarkt verwenden. Das meist weisse Fliegengitter muss dunkel gefärbt werden, damit es die Käfer nicht meiden.

Für den Trog verwenden wir ein halbiertes PVC Rohr, welches leicht in den Boden eingegraben wird.

Propylenglykol und Ethylenglykol (mit oder ohne Zusatz von Wasser) wird die Käfer töten. Allerdings wird Propylenglykol Säugetieren krank machen, wenn sie es trinken. Decken Sie das Rohr sicherheitshalber mit einem groben Gitter ab, damit Katzen und Hunde nicht von der Lösung trinken.

Leiodes (Schwammkugelkäfer) fliegen von Mitte September bis Ende Oktober tief über den Boden, um sich zu vermehren. Mit dem Gitter fangen wir die Käfer im nächtlichen Flug auf, bevor sie beginnen, die Trüffeln für Ihren Nachwuchs zu benutzen.